

平成18年度 環境省環境放射線等 モニタリング調査等業務結果報告書

（ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー
並びにストロンチウム90及びセシウム137の
放射化学分析に係る調査結果）

平成18年11月

財団法人 日本分析センター

目 次

はじめに

1. 調査の目的及び内容	1
2. 調査・分析内容及び調査・分析期間	1
2.1 調査・分析内容	1
2.2 調査・分析期間	7
3. 試料採取及び試料調製	7
3.1 試料採取方法	7
3.2 試料調製方法	8
4. 分析方法	8
4.1 γ 線スペクトロメトリー	8
4.2 放射化学分析	9
5. 分析結果	13
5.1 γ 線スペクトロメトリー	13
5.2 放射化学分析	25
5.3 分析結果及びその評価	31

参考資料

1. 試料採取状況	35
2. 測定機器の仕様	55
3. γ 線スペクトロメトリーのデータ	59
4. 放射性ストロンチウムの分析データ	267
5. 放射性セシウムの分析データ	285

はじめに

環境省では、平成 13 年 1 月の省庁再編に伴い「放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定」が新たに文部科学省と共管事務となったことを受けて、平成 12 年度より環境放射線等モニタリングを実施している。

具体的には、従前より設置していた国設酸性雨測定所の施設を活用し、離島等の遠隔地を中心として、全国 12 ヶ所の測定所に空間 γ 線測定装置及び大気浮遊じんの α 線・ β 線ダストモニタを設置し、それらをオンラインで接続し環境放射線に係る常時監視調査を実施している。また、測定所周辺において大気浮遊じんや土壌等の環境試料を定期的に採取し、ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー並びにストロンチウム 90 及びセシウム 137 の放射化学分析による調査を実施している。

本報告書は、上記の調査のうち、土壌等環境試料のゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー並びにストロンチウム 90 及びセシウム 137 の放射化学分析に係る調査結果について、「環境放射線等モニタリングデータ評価検討会」の検討結果を踏まえ、財団法人日本分析センターがとりまとめたものである。

なお、空間 γ 線線量率及び大気浮遊じんの全 α ・全 β 放射能濃度に係る調査結果については、「平成 18 年度環境放射線等モニタリング調査等業務結果報告書（空間 γ 線線量率及び大気浮遊じん中の全 α ・全 β 放射能濃度に係る調査結果）」にとりまとめている。

環境放射線等モニタリングデータ評価検討会

○環境放射線等モニタリングデータ評価検討会委員

- 委員長 小佐古 敏荘 東京大学大学院 工学系研究科原子力専攻 教授
- 委員 五十嵐 康人 気象庁 気象研究所 地球化学研究部第2研究室
主任研究官
- 武石 稔 独立行政法人 日本原子力研究開発機構
東海研究開発センター 核燃料サイクル工学研究所
放射線管理部 環境監視課長
- 土井 妙子 独立行政法人 国立環境研究所 水圏環境研究領域
水環境研究室 主任研究員
- 松浦 賢一 独立行政法人 日本原子力研究開発機構
東海研究開発センター 原子力科学研究所
放射線管理部 環境放射線管理課長代理
- 山崎 興樹 新潟県放射線監視センター 専門研究員

本検討会の内容については、「平成18年度環境省環境放射線等モニタリング調査等業務結果報告書（別冊）」に記載している。

1. 調査の目的及び内容

環境省では、放射性降下物等による環境への影響を把握するために、全国に設置された国設酸性雨測定所のうち遠隔地を含めた12ヶ所に、空間 γ 線測定装置及び大気浮遊じんの全 α 放射能及び全 β 放射能測定装置を設置し、空間 γ 線線量率並びに大気浮遊じんの全 α ・全 β 放射能濃度データ（以下「自動測定データ」という。）を自動収集するとともに、これらの自動測定データをオンラインで当該自治体を經由し、環境省及び財団法人日本分析センター（以下「分析センター」という。）へ自動送信・蓄積する環境放射性物質監視測定システムを運用している。また、12ヶ所の測定所周辺で採取した環境試料の放射性核種分析を行っている。

本調査は、12ヶ所の測定所に設置されている α 線・ β 線ダストモニタにより得られた大気浮遊じん試料（ろ紙）について放射能分析を行うとともに、測定所における大気降下物、測定所周辺における土壌及び陸水試料を採取し、放射能分析を行ったものである。また、利尻測定所及び伊自良湖測定所の維持管理を行った。

2. 調査・分析内容及び調査・分析期間

2.1 調査・分析内容

各測定所において、定期的に大気浮遊じん、大気降下物、土壌、陸水を採取し、ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリー並びに ^{90}Sr 及び ^{137}Cs の放射化学分析を行った。

試料名	測定所	測定頻度
大気浮遊じん	全測定所	3ヶ月に1回
大気降下物	4ヶ所（利尻、佐渡関岬、隠岐、五島）	3ヶ月に1回
土壌	4ヶ所（筑波、佐渡関岬、隠岐、辺戸岬）	年に1回
陸水	4ヶ所（筑波、佐渡関岬、隠岐、辺戸岬）	年に1回

なお、試料採取日、試料受領日、試料受領量を以下に示す。

試料名	採取地点	試料採取日	試料受領日	試料受領量	分析項目		
					γ	^{90}Sr	^{137}Cs
大気 浮遊じん	利尻	17.10.4 ~17.12.21	17.12.26	12,000 m ³	以下同じ		
		17.12.21 ~18.4.5	18.4.10	17,900 m ³			
		18.4.5 ~18.6.30	18.7.3	13,700 m ³			
	竜飛岬	17.9.27 ~17.12.20	17.12.21	12,300 m ³			
		17.12.20 ~18.3.28	18.3.29	14,900 m ³			
		18.3.28 ~18.6.20	18.6.21	12,800 m ³			
	筑波	17.9.26 ~17.12.26	18.1.4	13,700 m ³			
		17.12.26 ~18.3.24	18.3.27	13,200 m ³			
		18.3.24 ~18.6.26	18.6.27	14,000 m ³			
	佐渡関岬	17.9.29 ~17.12.28	18.1.6	13,300 m ³			
		17.12.28 ~18.3.30	18.4.4	13,500 m ³			
		18.3.30 ~18.6.29	18.7.4	13,000 m ³			
	越前岬	17.10.3 ~17.12.26	18.1.4	12,500 m ³			
		17.12.26 ~18.4.4	18.4.7	17,500 m ³			
		18.4.4 ~18.6.26	18.7.4	12,800 m ³			
	伊自良湖	17.10.3 ~18.1.27	18.1.31	16,600 m ³			
		18.1.27 ~18.3.31	18.4.4	8,850 m ³			
		18.3.31 ~18.6.26	18.6.28	12,600 m ³			
	隠岐	17.10.3 ~17.12.21	18.1.5	11,900 m ³			
		17.12.21 ~18.3.27	18.3.30	15,200 m ³			
		18.3.27 ~18.6.28	18.7.4	15,000 m ³			

試料名	採取地点	試料 採取日	試料 受領日	試料 受領量	分析項目		
					γ	⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs
大気 浮遊じん	蟠竜湖	17. 9. 27 ~17. 12. 19	18. 1. 5	12, 500 m ³	以下同じ		
		17. 12. 19 ~18. 3. 28	18. 3. 30	14, 500 m ³			
		18. 3. 28 ~18. 6. 28	18. 7. 4	13, 100 m ³			
	檮原	17. 10. 12 ~18. 1. 18	18. 1. 20	14, 200 m ³			
		18. 1. 18 ~18. 4. 12	18. 4. 14	11, 900 m ³			
		18. 4. 12 ~18. 7. 5	18. 7. 7	11, 800 m ³			
	対馬	17. 9. 29 ~17. 12. 21	18. 1. 5	12, 100 m ³			
		17. 12. 21 ~18. 3. 16	18. 3. 23	12, 400 m ³			
		18. 3. 16 ~18. 6. 8	18. 7. 12	12, 100 m ³			
	五島	17. 9. 27 ~17. 12. 20	18. 1. 5	12, 900 m ³			
		17. 12. 20 ~18. 3. 15	18. 3. 23	13, 300 m ³			
		18. 3. 15 ~18. 6. 6	18. 7. 12	13, 300 m ³			
	辺戸岬	17. 9. 26 ~17. 12. 19	17. 12. 22	12, 700 m ³			
		17. 12. 19 ~18. 3. 23	18. 3. 27	14, 300 m ³			
		18. 3. 23 ~18. 7. 3	18. 7. 6	15, 300 m ³			

試料名	採取地点	試料 採取日	試料 受領日	分析項目			
				γ	^{90}Sr	^{137}Cs	
大気降下物	利尻	17. 10. 4 ~17. 10. 26	17. 10. 31	γ	^{90}Sr	^{137}Cs	
		17. 10. 26 ~17. 11. 28	17. 12. 5				
		17. 11. 28 ~17. 12. 21	17. 12. 26				
		17. 12. 21 ~18. 2. 1	18. 2. 6	以下同じ			
		18. 2. 1 ~18. 3. 6	18. 3. 9				
		18. 3. 6 ~18. 4. 5	18. 4. 10				
		18. 4. 5 ~18. 5. 1	18. 5. 8				
		18. 5. 1 ~18. 5. 30	18. 6. 2				
		18. 5. 30 ~18. 6. 30	18. 7. 3				
	17. 9. 29 ~17. 10. 31	17. 11. 2					
	17. 10. 31 ~17. 12. 1	17. 12. 6					
	17. 12. 1 ~17. 12. 28	18. 1. 6					
	17. 12. 28 ~18. 1. 27	18. 1. 31					
	18. 1. 27 ~18. 2. 24	18. 2. 28					
	18. 2. 24 ~18. 3. 30	18. 4. 4					
	18. 3. 30 ~18. 4. 28	18. 5. 2					
	18. 4. 28 ~18. 5. 31	18. 6. 2					
	18. 5. 31 ~18. 6. 29	18. 7. 4					
	佐渡関岬						

試料名	採取地点	試料 採取日	試料 受領日	分析項目			
				γ	^{90}Sr	^{137}Cs	
大気降下物	隠岐	17. 10. 3 ~17. 10. 24	17. 10. 26	γ	^{90}Sr	^{137}Cs	
		17. 10. 24 ~17. 11. 28	17. 11. 30				
		17. 11. 28 ~17. 12. 21	17. 12. 26				
		17. 12. 21 ~18. 1. 26	18. 1. 30	以下同じ			
		18. 1. 26 ~18. 2. 28	18. 3. 2				
		18. 2. 28 ~18. 3. 27	18. 3. 29				
		18. 3. 27 ~18. 5. 1	18. 5. 8				
		18. 5. 1 ~18. 5. 30	18. 6. 1				
		18. 5. 30 ~18. 6. 28	18. 6. 30				
		17. 10. 3 ~17. 11. 1	17. 11. 4				
	17. 11. 1 ~17. 12. 1	17. 12. 9					
	17. 12. 1 ~18. 1. 4	18. 1. 6					
	18. 1. 4 ~18. 1. 31	18. 2. 2					
	18. 1. 31 ~18. 2. 28	18. 3. 2					
	18. 2. 28 ~18. 3. 31	18. 4. 3					
	18. 3. 31 ~18. 5. 1	18. 5. 8					
	18. 5. 1 ~18. 6. 1	18. 6. 5					
	18. 6. 1 ~18. 7. 3	18. 7. 5					

試料名	採取地点		試料採取日	試料受領日	試料受領量	分析項目		
						γ	^{90}Sr	^{137}Cs
土 壤	筑波	0～5 cm	18. 6. 22	18. 6. 26	3. 9 kg	以下同じ		
		5～20 cm	18. 6. 22	18. 6. 26	9. 5 kg			
	佐渡関岬	0～5 cm	18. 6. 29	18. 7. 3	2. 3 kg			
		5～20 cm	18. 6. 29	18. 7. 3	9. 0 kg			
	隠岐	0～5 cm	18. 6. 29	18. 7. 3	3. 0 kg			
		5～20 cm	18. 6. 29	18. 7. 3	11. 0 kg			
	辺戸岬	0～5 cm	18. 6. 21	18. 6. 23	3. 3 kg			
		5～20 cm	18. 6. 21	18. 6. 23	10. 9 kg			
陸 水	筑波 雪入川		18. 6. 22	18. 6. 26	260 L			
	佐渡関岬 関川		18. 6. 29	18. 7. 3	260 L			
	隠岐 亀の原池		18. 6. 29	18. 7. 3	260 L			
	辺戸岬 辺野喜川		18. 6. 21	18. 6. 23	260 L			

γ : γ 線スペクトロメトリーによる ^7Be , ^{54}Mn , ^{59}Fe , ^{58}Co , ^{60}Co , ^{65}Zn , ^{95}Zr ,
 ^{95}Nb , ^{103}Ru , ^{106}Ru , ^{125}Sb , ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{140}Ba , ^{140}La 及び ^{144}Ce の定量

^{90}Sr : 放射化学分析による ^{90}Sr の定量

^{137}Cs : 放射化学分析による ^{137}Cs の定量

2.2 調査・分析期間

試料採取（土壌、陸水）	平成18年6月21日～平成18年6月29日
試料調製	平成18年6月7日～平成18年7月24日
γ線スペクトロメトリー	平成18年6月19日～平成18年8月10日
放射性ストロンチウム分析	平成18年7月10日～平成18年9月1日
放射性セシウム分析	平成18年7月10日～平成18年8月20日

3. 試料採取及び試料調製

3.1 試料採取方法

試料採取は、文部科学省放射能測定法シリーズ16「環境試料採取法」（昭和58年）に準じて行った。操作の概略を以下に示す。

(1) 大気浮遊じん

測定所（12ヶ所）に設置され測定を行っているα線・β線ダストモニタにより得られた大気浮遊じん試料（ろ紙）について、その機器の管理者が3ヶ月毎に採取して、ポリエチレン製の袋に梱包後、分析センターへ送付した。

(2) 大気降下物

測定所（4ヶ所）に設置されている大型水盤で得られた大気降下物について、その機器の管理者が1ヶ月毎に採取して、容器に入れ梱包後、分析センターへ送付した。

(3) 土壌

測定所周辺の採取場所において9～11ヶ所の採取地点を選定し、分析センターが採取を行った。採取に当たって、鎌で草を刈り、採土器を採取地点に垂直に置き、ハンマーで0～5cmの深さまで打ち込んだ後、採土器の外側の土壌をスコップで注意深く取り除いて採土器を回収し、土壌を採取した。また、同じ採取地点で、同様の方法で5～20cmの深さの土壌を採取した。採取した土壌を、ポリエチレン製の袋に移し、バネ秤で重量をはかった。

(4) 陸水

測定所周辺の採取場所において、分析センターが採取を行った。バケツで水を採取し、漏斗を用いて容器（キュービテナー）に入れ、ただちに一定量の塩酸を加えて密栓した。また、採取時に水温及びpHを測定した。

3.2 試料調製方法

試料調製は、文部科学省放射能測定法シリーズ16「環境試料採取法」（昭和58年）に準じて行った。操作の概略を以下に示す。

(1) 大気浮遊じん（ γ 線スペクトロメトリー）

送付試料を磁製皿に移し、電気炉に入れ450℃で灰化し、灰をよく混合した後、700mLマリネリ容器に詰めて押し固め、ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

(2) 大気降下物（ γ 線スペクトロメトリー）

送付試料全量に担体（ Sr^{2+} 、 Cs^+ ）の一定量を添加し、加熱濃縮後、プラスチック製円筒型容器（高さ7cm、直径5cm）に移し、赤外線ランプ下で蒸発乾固した。ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

(3) 土壌

採取試料をバットにひろげ、植物根、石れき等を取り除き、105℃に調節した乾燥機中で乾燥した。磁製乳鉢で土塊を摩砕し、2mmのふるいに通した後、ふるい下をさらに粉碎し、よく混合して分析試料とした。

γ 線スペクトロメトリー用の試料は、分析試料をプラスチック製円筒型容器（高さ7cm、直径5cm）に詰めて押し固め、ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

(4) 陸水（ γ 線スペクトロメトリー）

採取試料から100Lを分取後、担体（ Sr^{2+} 、 Cs^+ ）の一定量を添加し、加熱濃縮後、プラスチック製円筒型容器（高さ7cm、直径5cm）に移し、赤外線ランプ下で蒸発乾固した。ポリエチレン製の袋で二重に包み、測定試料とした。

4. 分析方法

4.1 γ 線スペクトロメトリー

文部科学省放射能測定法シリーズ7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（平成4年改訂）に準じて行った。操作の概略は以下のとおりである。

(1) 測定試料を検出器エンドキャップに載せ、70,000秒間以上測定した。また、原則として1週間ごとに検出器に何も載せず、140,000秒間以上測定し、バックグラウンドとした。

(2) 測定スペクトル中から適当なピーク3本以上を選択し、これらを用いて γ 線エネルギーとピーク位置の関係を表すエネルギー校正曲線（2次式）を作成し、

計算で分析目的核種のピーク領域を求めた。

- (3) 分析目的核種のピーク領域内の計数値を用いてピーク面積を計算し、他核種からの妨害が認められたときは補正した。
- (4) バックグラウンドの測定結果において、ピーク探査によって分析目的核種のピークが認められピーク面積が計数誤差の2倍を超えた場合は、試料のピーク面積から引算した。計算には、試料の前後に測定したバックグラウンドの平均値を用いた。
- (5) (3)及び(4)の処理を施したピーク面積を、ピーク効率と分析目的核種の γ 線放出比で除し、試料採取日に減衰補正して測定試料当りの放射能を求めたのち、測定供試量で除して分析結果とした。
- (6) ピーク効率の測定試料形状依存性は ^{137}Cs 容積線源を、エネルギー依存性は混合核種点線源を、それぞれ測定して求めた。
マリネリ容器に関するピーク効率は、混合核種容積線源を測定して求めた。なお、 ^{57}Co 、 ^{60}Co 及び ^{88}Y のピーク効率を求める際には、サム効果の影響について補正した。
- (7) 測定試料による γ 線の自己吸収は、試料ごとに計算により補正した。また、 ^{59}Fe 、 ^{58}Co 、 ^{60}Co 及び ^{134}Cs はサム効果の影響を補正した。
- (8) 核データは原則としてAtomic Data and Nuclear Data Tables (1983年)に従った。

4.2 放射化学分析

(1) 放射性ストロンチウム分析

文部科学省放射能測定法シリーズ2「放射性ストロンチウム分析法」(平成15年改訂)に準じて行った。操作の概略は以下のとおりである。

1) 化学分離

① 大気浮遊じん

測定済試料(γ 線スペクトロメトリー)に担体(Sr^{2+} 、 Cs^+)の一定量を添加し、塩酸(1+11)を加えて加熱抽出した。残留物をろ別し、ろ液から炭酸塩沈殿としてストロンチウム等を分離した。沈殿は ^{90}Sr 分析に、上澄み液は ^{137}Cs 分析に用いた。

沈殿に塩酸を加えて溶解し、シュウ酸塩沈殿としてストロンチウム等を分離した。シュウ酸塩沈殿を 600°C に加熱後、塩酸で溶解し、イオン交換法でカルシウム等を除去した。溶出液を蒸発乾固し乾固物を水に溶解後、 ^{90}Y を除去

(スカベンジング) し、二週間放置して、新たに生成した ^{90}Y を水酸化第二鉄沈殿に共沈させ (ミルクキング)、分離型フィルターを用いてマウントし、測定試料とした。

② 大気降下物

測定済試料 (γ 線スペクトロメトリー) に王水及び硝酸を加えて分解したのち、塩酸を加えて加熱抽出し、残留物をろ別した。その後の操作は①大気浮遊じんの炭酸塩沈殿以降と同様に行った。

③ 土壌

分析試料から 100g を分取し、450°C の電気炉で加熱処理後、担体 (Sr^{2+} 、 Cs^+) の一定量を添加し、塩酸を加えて加熱抽出し、残留物をろ別した。その後の操作は①大気浮遊じんの炭酸塩沈殿以降と同様に行った。

なお、回収率補正のための安定ストロンチウムの定量は、イットリウムを内標準とした ICP 発光分光分析法により行った。

④ 陸水

測定済試料 (γ 線スペクトロメトリー) に王水及び硝酸を加えて分解したのち、塩酸を加えて加熱抽出し、残留物をろ別した。その後の操作は①大気浮遊じんの炭酸塩沈殿以降と同様に行った。

なお、回収率補正のための安定ストロンチウムの定量は、イットリウムを内標準とした ICP 発光分光分析法により行った。

2) 測定

測定試料を低バックグラウンド β 線測定装置 (LBC) で 3,600~7,200 秒間測定した。測定試料の正味計数率を求め、計数効率、化学回収率等の補正を行い試料の放射能濃度を算出し、分析結果は試料採取日に減衰補正した。

(2) 放射性セシウム分析

文部科学省放射能測定法シリーズ 3「放射性セシウム分析法」(昭和 51 年改訂) に準じて行った。操作の概略は以下のとおりである。

1) 化学分離

(1) 放射性ストロンチウム分析の上澄み液に塩酸を加え、5% 塩酸溶液とした。これにリンモリブデン酸アンモニウム (AMP) を加え攪拌しセシウムを吸着させた。AMP を溶解し、陽イオン交換樹脂カラムでセシウムを分離・精製後、塩化白金酸セシウム沈殿として分離型フィルターを用いてマウントし、測定試料とした。

2) 測定

測定試料を低バックグラウンド β 線測定装置(LBC)で5,400~12,000秒間測定した。測定試料の正味計数率を求め、計数効率、化学回収率等の補正を行い試料の放射能濃度を算出し、分析結果は試料採取日に減衰補正した。

5. 分析結果

5.1 γ線スペクトロメトリー

(1) 大気浮遊じん

試料名	採取地点	試料採取日	γ線スペクトロメトリー															単位	
			⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La		¹⁴⁴ Ce
大気浮遊じん	利尻	17.10.4 ~17.12.21	2.4±0.24	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		17.12.21 ~18.4.5	2.4±0.08	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18.4.5 ~18.6.30	1.7±0.04	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	竜飛岬	17.9.27 ~17.12.20	2.4±0.24	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		17.12.20 ~18.3.28	3.2±0.10	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18.3.28 ~18.6.20	2.5±0.06	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	筑波	17.9.26 ~17.12.26	2.3±0.21	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		17.12.26 ~18.3.24	2.7±0.11	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18.3.24 ~18.6.26	2.6±0.05	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	佐渡関岬	17.9.29 ~17.12.28	2.3±0.21	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		17.12.28 ~18.3.30	3.4±0.11	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18.3.30 ~18.6.29	3.0±0.05	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

試料名	採取地点	試料 採取日	γ線スペクトロメトリー															単位	
			⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La		¹⁴⁴ Ce
大気 浮遊じん	越前岬	17.10.3 ~17.12.26	3.2±0.18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		17.12.26 ~18.4.4	3.3±0.09	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18.4.4 ~18.6.26	2.7±0.06	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	伊自良湖	17.10.3 ~18.1.27	1.9±0.13	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18.1.27 ~18.3.31	3.7±0.14	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18.3.31 ~18.6.26	3.3±0.06	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	隠岐	17.10.3 ~17.12.21	3.0±0.25	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		17.12.21 ~18.3.27	2.9±0.10	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18.3.27 ~18.6.28	1.9±0.04	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	蟠竜湖	17.9.27 ~17.12.19	3.8±0.27	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		17.12.19 ~18.3.28	3.9±0.11	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18.3.28 ~18.6.28	3.3±0.06	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

mBq/m³

試料名	採取地点	試料 採取日	γ線スペクトロメトリー															単位	
			⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La		¹⁴⁴ Ce
大気 浮遊じん	樽原	17. 10. 12 ~18. 1. 18	3.3±0.17	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		18. 1. 18 ~18. 4. 12	4.4±0.11	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18. 4. 12 ~18. 7. 5	3.0±0.06	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	対馬	17. 9. 29 ~17. 12. 21	3.7±0.27	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		17. 12. 21 ~18. 3. 16	4.3±0.13	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18. 3. 16 ~18. 6. 8	3.9±0.08	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	五島	17. 9. 27 ~17. 12. 20	3.4±0.26	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		17. 12. 20 ~18. 3. 15	4.0±0.14	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18. 3. 15 ~18. 6. 6	4.2±0.08	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	辺戸岬	17. 9. 26 ~17. 12. 19	3.7±0.26	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		17. 12. 19 ~18. 3. 23	2.8±0.10	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18. 3. 23 ~18. 7. 3	2.2±0.05	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

- 1) 分析結果は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁、それ以下のものについては**で示し、誤差は計数誤差のみを示した。
2) 分析結果は、試料採取日に減衰補正した。

(2) 大気降下物

試料名	採取地点	試料採取日	γ線スペクトロメトリー															単位	
			⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La		¹⁴⁴ Ce
大気降下物	利尻	17.10.4 ~17.12.21	330±5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.15 ±0.023	**	**	**	
		17.12.21 ~18.4.5	240±2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.093±0.017	**	**	**	
		18.4.5 ~18.6.30	270±2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.41 ±0.038	**	**	**	
	佐渡関岬	17.9.29 ~17.12.28	670±7	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		17.12.28 ~18.3.30	370±3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.20 ±0.022	**	**	**	
		18.3.30 ~18.6.29	250±1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.27 ±0.021	**	**	**	
	隠岐	17.10.3 ~17.12.21	440±8	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		17.12.21 ~18.3.27	390±3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.13 ±0.027	**	**	**	
		18.3.27 ~18.6.28	210±1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.23 ±0.025	**	**	**	
	五島	17.10.3 ~18.1.4	410±5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		18.1.4 ~18.3.31	260±2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.055±0.017	**	**	**	
		18.3.31 ~18.7.3	460±2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.074±0.016	**	**	**	

1) 分析結果は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁、それ以下のものについては**で示し、誤差は計数誤差のみを示した。

2) 分析結果は、試料採取日に減衰補正した。

(3) 土壤

試料名	採取地点	採取深度 (cm)	試料 採取日	γ線スペクトロメトリー																単位	
				⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La	¹⁴⁴ Ce		
土 壤	筑 波	0～5cm	18. 6. 22	11±3.2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	3.4±0.28	**	**	**	
		5～20cm	18. 6. 22	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1.5±0.27	**	**	**
	佐渡関岬	0～5cm	18. 6. 29	17±5.3	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	68 ±0.9	**	**	**
		5～20cm	18. 6. 29	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	31 ±0.7	**	**	**
	隠 岐	0～5cm	18. 6. 29	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	25 ±0.6	**	**	**
		5～20cm	18. 6. 29	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	4.8±0.34	**	**	**
	辺 戸 岬	0～5cm	18. 6. 21	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1.3±0.20	**	**	**
		5～20cm	18. 6. 21	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1.9±0.27	**	**	**

- 1) 分析結果は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁、それ以下のものについては**で示し、誤差は計数誤差のみを示した。
 2) 分析結果は、試料採取日に減衰補正した。

(4) 陸水

試料名	採取地点	試料採取日	γ線スペクトロメトリー															単位
			⁷ Be	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁶⁵ Zn	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁰ Ba	¹⁴⁰ La	
陸水	筑波 雪入川	18. 6.22	8.5±0.74	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0.22±0.064	**	**	**
	佐渡関岬 関川	18. 6.29	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	隠岐 亀の原池	18. 6.29	5.0±1.0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	辺戸岬 辺野喜川	18. 6.21	2.9±0.82	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

1) 分析結果は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁、それ以下のものについては**で示し、誤差は計数誤差のみを示した。

2) 分析結果は、試料採取日に減衰補正した。

5.2 放射化学分析

(1) 大気浮遊じん

試料名	採取地点	試料 採取日	分析結果		単位
			⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs	
大気 浮遊じん	利 尻	17. 10. 4 ~17. 12. 21	*	*	mBq/m ³
		17. 12. 21 ~18. 4. 5	*	*	
		18. 4. 5 ~18. 6. 30	*	*	
	竜 飛 岬	17. 9. 27 ~17. 12. 20	*	*	
		17. 12. 20 ~18. 3. 28	*	*	
		18. 3. 28 ~18. 6. 20	*	*	
	筑 波	17. 9. 26 ~17. 12. 26	*	*	
		17. 12. 26 ~18. 3. 24	*	*	
		18. 3. 24 ~18. 6. 26	*	*	
	佐渡関岬	17. 9. 29 ~17. 12. 28	*	*	
		17. 12. 28 ~18. 3. 30	*	*	
		18. 3. 30 ~18. 6. 29	*	*	

試料名	採取地点	試料 採取日	分析結果		単位
			⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs	
大気 浮遊じん	越前岬	17. 10. 3 ~17. 12. 26	*	*	mBq/m ³
		17. 12. 26 ~18. 4. 4	*	*	
		18. 4. 4 ~18. 6. 26	*	*	
	伊自良湖	17. 10. 3 ~18. 1. 27	*	*	
		18. 1. 27 ~18. 3. 31	*	*	
		18. 3. 31 ~18. 6. 26	*	*	
	隠岐	17. 10. 3 ~17. 12. 21	*	*	
		17. 12. 21 ~18. 3. 27	*	*	
		18. 3. 27 ~18. 6. 28	*	*	
	蟠竜湖	17. 9. 27 ~17. 12. 19	*	*	
		17. 12. 19 ~18. 3. 28	*	*	
		18. 3. 28 ~18. 6. 28	*	*	

試料名	採取地点	試料 採取日	分析結果		単位
			⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs	
大気 浮遊じん	檮原	17. 10. 12 ~18. 1. 18	*	*	mBq/m ³
		18. 1. 18 ~18. 4. 12	*	*	
		18. 4. 12 ~18. 7. 5	*	*	
	対馬	17. 9. 29 ~17. 12. 21	*	*	
		17. 12. 21 ~18. 3. 16	*	*	
		18. 3. 16 ~18. 6. 8	*	*	
	五島	17. 9. 27 ~17. 12. 20	*	*	
		17. 12. 20 ~18. 3. 15	*	*	
		18. 3. 15 ~18. 6. 6	*	*	
	辺戸岬	17. 9. 26 ~17. 12. 19	*	*	
		17. 12. 19 ~18. 3. 23	*	*	
		18. 3. 23 ~18. 7. 3	*	*	

- 1) 大気浮遊じんの捕集に用いたろ紙 (HE-40T) には微量の ⁹⁰Sr が含まれており、相当分をblank値として試料の放射能から差し引いた。
- 2) 分析結果は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁、それ以下のものについては*で示し、誤差は計数誤差のみを示した。
- 3) 分析結果は試料採取日に減衰補正した。

(2) 大気降下物

試料名	採取地点	試料 採取日	分析結果		単位
			⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs	
大気 降下物	利 尻	17. 10. 4 ~17. 12. 21	0. 11 ±0. 019	0. 10 ±0. 014	MBq/km ²
		17. 12. 21 ~18. 4. 5	0. 052±0. 017	0. 067±0. 013	
		18. 4. 5 ~18. 6. 30	0. 25 ±0. 024	0. 29 ±0. 022	
	佐渡関岬	17. 9. 29 ~17. 12. 28	0. 10 ±0. 019	0. 037±0. 010	
		17. 12. 28 ~18. 3. 30	*	0. 22 ±0. 018	
		18. 3. 30 ~18. 6. 29	0. 085±0. 019	0. 22 ±0. 018	
	隠 岐	17. 10. 3 ~17. 12. 21	0. 38 ±0. 031	0. 11 ±0. 014	
		17. 12. 21 ~18. 3. 27	0. 22 ±0. 027	0. 15 ±0. 015	
		18. 3. 27 ~18. 6. 28	0. 25 ±0. 026	0. 20 ±0. 017	
	五 島	17. 10. 3 ~18. 1. 4	0. 074±0. 020	*	
		18. 1. 4 ~18. 3. 31	0. 095±0. 018	0. 052±0. 011	
		18. 3. 31 ~18. 7. 3	*	0. 096±0. 014	

- 1) 分析結果は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁、それ以下のものについては*で示し、誤差は計数誤差のみを示した。
- 2) 分析結果は試料採取日に減衰補正した。

(3) 土壤

試料名	採取地点	採取深度 (cm)	試料 採取日	分析結果		単位
				^{90}Sr	^{137}Cs	
土 壤	筑 波	0～5cm	18. 6. 22	2.1 ±0.17	2.7 ±0.16	Bq/kg 乾土
		5～20cm	18. 6. 22	1.4 ±0.14	1.2 ±0.11	
	佐渡関岬	0～5cm	18. 6. 29	6.1 ±0.30	62 ±0.7	
		5～20cm	18. 6. 29	4.6 ±0.25	27 ±0.5	
	隠 岐	0～5cm	18. 6. 29	1.8 ±0.16	23 ±0.4	
		5～20cm	18. 6. 29	0.60±0.11	4.9 ±0.20	
	辺 戸 岬	0～5cm	18. 6. 21	*	0.92±0.099	
		5～20cm	18. 6. 21	*	1.4 ±0.12	

- 1) 分析結果は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁、それ以下のものについては*で示し、誤差は計数誤差のみを示した。
- 2) 分析結果は試料採取日に減衰補正した。

(4) 陸水

試料名	採取地点	試料 採取日	分析結果		単位
			⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs	
陸水	筑波 雪入川	18. 6. 22	2.7 ±0.24	*	mBq/L
	佐渡関岬 関川	18. 6. 29	*	*	
	隠岐 亀の原池	18. 6. 29	1.9 ±0.21	*	
	辺戸岬 辺野喜川	18. 6. 21	2.3 ±0.22	*	

- 1) 分析結果は、計数値がその計数誤差の3倍を超えるものについて有効数字2桁、それ以下のものについては*で示し、誤差は計数誤差のみを示した。
- 2) 分析結果は試料採取日に減衰補正した。

5.3 分析結果及びその評価

(1) γ 線スペクトロメトリー

γ 線スペクトロメトリーの分析結果については、過去3年間（平成14年度から平成16年度）における原子力発電所施設等の周辺の環境放射線監視結果（以下「環境放射線監視結果」という。）及び水準調査結果*1と比較評価を行った。

① 大気浮遊じん

今回の調査において採取された大気浮遊じん中の人工放射性核種の測定結果は、その計数値が計数誤差の3倍以下であった。また、宇宙線生成核種*2である ^7Be 濃度は1.7～4.4mBq/m³であった。

平成14年度から平成16年度までの環境放射線監視結果及び水準調査結果における大気浮遊じんの ^{137}Cs 濃度は不検出（データ数:3665）～0.012mBq/m³（検出されたデータ数:1）、 ^7Be 濃度は不検出（データ数:3）～12mBq/m³（検出されたデータ数:2345）、 ^{137}Cs 以外の人工放射性核種は不検出であり、今回の調査結果はこの範囲内であった。

② 大気降下物

大気降下物については、1ヶ月毎に試料を採取しているが、分析は3ヶ月分をまとめて試料としている。一方、環境放射線監視及び水準調査では1ヶ月分を試料としているため、本調査結果を1ヶ月分の放射能濃度に換算した。

今回の調査において採取された大気降下物中の人工放射性核種の測定結果は、 ^{137}Cs を除いてその計数値が計数誤差の3倍以下、 ^{137}Cs 濃度は不検出～0.14MBq/(km²・月)、 ^7Be 濃度は70～220MBq/(km²・月)であった。

平成14年度から平成16年度までの環境放射線監視結果及び水準調査結果における大気降下物の ^{137}Cs 濃度は不検出（データ数:3182）～0.71MBq/(km²・月）（検出されたデータ数:151）、 ^7Be 濃度は不検出（データ数:3）～1400MBq/(km²・月）（検出されたデータ数:2552）、 ^{137}Cs 以外の人工放射性核種は不検出であり、今回の調査結果はこの範囲内であった。

③ 土壌（採取深度0～5cm及び5～20cm）

イ) 採取深度0～5cm

今回の調査において採取された土壌中の人工放射性核種の測定結果は、 ^{137}Cs を除いてその計数値が計数誤差の3倍以下、 ^{137}Cs 濃度は1.3～68Bq/kg乾土、 ^7Be 濃度は不検出～17Bq/kg乾土であった。

平成14年度から平成16年度までの環境放射線監視結果及び水準調査結果における土壌（採取深度0～5cm）の ^{137}Cs 濃度は不検出（データ数:55）～200Bq/kg乾土

*1 水準調査：文部科学省が実施している放射能測定調査及び環境放射能水準調査

*2 宇宙線生成核種：宇宙線と大気との相互作用により生成された放射性核種

(検出されたデータ数：638)、 ^7Be 濃度は不検出（データ数：262）～43Bq/kg 乾土（検出されたデータ数：105）、 ^{137}Cs 以外の人工放射性核種は不検出であり、今回の調査結果はこの範囲内であった。

ロ) 採取深度 5～20cm

今回の調査において採取された土壌中の人工放射性核種の測定結果は、 ^{137}Cs を除いてその計数値が計数誤差の 3 倍以下、 ^{137}Cs 濃度は 1.5～31Bq/kg 乾土であった。

平成 14 年度から平成 16 年度までの水準調査結果における土壌（採取深度 5～20cm）の ^{137}Cs 濃度は不検出（データ数：31）～39Bq/kg 乾土（検出されたデータ数：112）、 ^{137}Cs 以外の人工放射性核種は不検出であり、今回の調査結果はこの範囲内であった。

④ 陸水

今回の調査において採取された陸水中の人工放射性核種の測定結果は、 ^{137}Cs を除いてその計数値が計数誤差の 3 倍以下、 ^{137}Cs 濃度は不検出～0.22mBq/L、 ^7Be 濃度は不検出～8.5mBq/L であった。

平成 14 年度から平成 16 年度までの環境放射線監視結果及び水準調査結果における ^{137}Cs 濃度は不検出（データ数：1280）～2.3mBq/L（検出されたデータ数：12）、 ^7Be 濃度は不検出（データ数：695）～380mBq/L（検出されたデータ数：139）、 ^{137}Cs 以外の人工放射性核種はいずれも不検出であり、今回の調査結果はこの範囲内であった。

(2) 放射化学分析

放射化学分析の分析結果については、過去 3 年間（平成 14 年度から平成 16 年度）の環境放射線監視結果及び水準調査結果（放射化学分析）と比較評価を行った。なお、大気降下物については、1 ヶ月毎に試料を採取しているが、分析は 3 ヶ月分をまとめて試料としている。一方、水準調査では 1 ヶ月分を試料としているため、本調査結果を 1 ヶ月分の放射能濃度に換算した。

1) 放射性ストロンチウム分析

① 大気浮遊じん

今回の調査において採取された大気浮遊じんの ^{90}Sr 濃度は、すべて不検出であった。

平成 14 年度から平成 16 年度までの環境放射線監視結果及び水準調査結果における大気浮遊じんの ^{90}Sr 濃度は不検出（データ数：531）～0.0025mBq/m³（検出されたデータ数：7）であり、今回の調査結果は、この範囲内であった。

② 大気降下物

今回の調査において採取された大気降下物の ^{90}Sr 濃度は、不検出～0.13MBq/(km²・月) であった。

平成 14 年度から平成 16 年度までの環境放射線監視結果及び水準調査結果における大気降下物の ^{90}Sr 濃度は不検出（データ数：1646） $\sim 0.22\text{MBq}/(\text{km}^2\cdot\text{月})$ （検出されたデータ数：97）であり、今回の調査結果は、この範囲内であった。

③ 土壌

今回の調査において採取された土壌の ^{90}Sr 濃度は、深さ 0 \sim 5cm で不検出 $\sim 6.1\text{Bq}/\text{kg}$ 乾土、深さ 5 \sim 20cm で不検出 $\sim 4.6\text{Bq}/\text{kg}$ 乾土であった。

平成 14 年度から平成 16 年度までの環境放射線監視結果及び水準調査結果における土壌（深さ 0 \sim 5cm）の ^{90}Sr 濃度は不検出（データ数：28） $\sim 16\text{Bq}/\text{kg}$ 乾土（検出されたデータ数：245）、また、土壌（深さ 5 \sim 20cm）の ^{90}Sr 濃度は不検出（データ数：18） $\sim 10\text{Bq}/\text{kg}$ 乾土（検出されたデータ数：125）であり、今回の調査結果は、この範囲内であった。

④ 陸水

今回の調査において採取された陸水の ^{90}Sr 濃度は、不検出 $\sim 2.7\text{mBq}/\text{L}$ であった。

平成 14 年度から平成 16 年度までの環境放射線監視結果及び水準調査結果における陸水の ^{90}Sr 濃度は不検出（データ数：147） $\sim 8.9\text{mBq}/\text{L}$ （検出されたデータ数：307）であり、今回の調査結果は、この範囲内であった。

2) 放射性セシウム分析

① 大気浮遊じん

今回の調査において採取された大気浮遊じんの ^{137}Cs 濃度は、すべて不検出であった。

平成 14 年度から平成 16 年度までの水準調査結果における大気浮遊じんの ^{137}Cs 濃度は不検出（データ数：403） $\sim 0.0039\text{mBq}/\text{m}^3$ （検出されたデータ数：15）であり、今回の調査結果は、この範囲内であった。

② 大気降下物

今回の調査において採取された大気降下物の ^{137}Cs 濃度は、不検出 $\sim 0.097\text{MBq}/(\text{km}^2\cdot\text{月})$ であった。

平成 14 年度から平成 16 年度までの水準調査結果における大気降下物の ^{137}Cs 濃度は不検出（データ数：1530） $\sim 0.63\text{MBq}/(\text{km}^2\cdot\text{月})$ （検出されたデータ数：165）であり、今回の調査結果は、この範囲内であった。

③ 土壌

今回の調査において採取された土壌の ^{137}Cs 濃度は、深さ 0 \sim 5cm で $0.92\sim 62\text{Bq}/\text{kg}$ 乾土、深さ 5 \sim 20cm で $1.2\sim 27\text{Bq}/\text{kg}$ 乾土であった。

平成 14 年度から平成 16 年度までの水準調査結果における土壌（深さ 0 \sim 5cm）の ^{137}Cs 濃度は $0.3\sim 71\text{Bq}/\text{kg}$ 乾土（検出されたデータ数：144）、また、土壌（深さ 5 \sim

20cm) の ^{137}Cs 濃度は不検出 (データ数: 4) ~32Bq/kg 乾土 (検出されたデータ数: 139) であり、今回の調査結果は、この範囲内であった。

④ 陸水

今回の調査において採取された陸水の ^{137}Cs 濃度は、すべて不検出であった。

平成 14 年度から平成 16 年度までの水準調査結果における陸水の ^{137}Cs 濃度は不検出 (データ数: 228) ~1.7mBq/L (検出されたデータ数: 19) であり、今回の調査結果は、この範囲内であった。